

## **О ситуации с мышевидными в Ростовской области**

Отдел по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области сообщает, что при проведении фитосанитарного обследования выявлено заселение сельхозугодий мышевидными грызунами с превышением экономического порога вредоносности (ЭПВ). Руководителям хозяйств области необходимо организовать мониторинг численности, обследовать посевы озимых культур и многолетних трав, лесополосы, пастбищные, целинные и бросовые участки, находящиеся вблизи посевов. При превышении ЭПВ необходимо незамедлительно приступить к обработке сельхозугодий родентицидными препаратами. В начале повторного заселения обработанных площадей эффективно проведение краевых обработок, захватывающих лесные полосы, обочины, пастбища, прилегающие к посевам.

В связи с массовой гибелю диких птиц и млекопитающих по причине нарушения правил внесения родентицидов (превышения норм, использования запрещённого рассева на поверхности почвы) сельхозтоваропроизводителям необходимо обращать внимание на использование следующих препаратов В РАЗРЕШЁННЫХ НОРМАХ. Родентициды, требующие приманочного продукта: Антимышин, ГР; Килрат Супер, ГР; Курант, ГР; Изоцин БФК, МК; Дедмайс, ГР; Бром-БД, Концентрат. Перед применением необходимо смешать их с приманочным продуктом (зерно пшеницы, лущёный овёс, кубики моркови, картофеля, сахарной свёклы, яблока) в соотношении 20 мл препарата на 1 кг приманки. Расход смеси — до 4 кг/га, 10 г/нору (кроме Бром-БД, Концентрат- до 2 кг/га, 5 г/нору). Готовые родентициды: Варат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Клерат, Г (до 3 кг/га, 5 г (1 брикет) на нору); Бродифакум Гранд, Г (до 4 кг/га, 10 г/нору); Килмайс, ТБ (до 4 кг/га, 5 г (1 брикет) на нору); Морторат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Варат, ТБ (до 2 кг/га, 3,6 г (1 брикет) на нору); Варат, МБ (до 2 кг/га, 13 г (1 брикет) на 2 норы); Норат, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Раттидион, Г (до 2 кг/га, 5 г/нору); Бактороденцид, ПР (до 3 кг/га, 5 г/нору).

Все родентициды вносятся специальными аппликаторами ложечного или трубчатого типа в норы грызунов на сельхозугодиях либо в трубы или приманочные ящики в лесополосах, на складах и в зернохранилищах. Родентициды должны находиться в условиях, исключающих поедание человеком и нецелевыми организмами как до, так и после внесения! Следует применять только препараты, включённые в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации». Запрещено превышение норм внесения, регламентированных «Каталогом». Применение пестицидов необходимо проводить только после обследования сельскохозяйственных угодий. При обращении с пестицидами следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Несоблюдение перечисленных требований является нарушением Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», и влечёт за собой административную и уголовную ответственность!